PARCELLAIRE DES SURFACES CONSACREES A L'EPANDAGE DE DIGESTAT SOLIDE ET LIQUIDE

Exploitant	Département	Commune	N° Ilot	Sous-ilôt	Surface totale	Type de culture (assolement moyen)	Nature sol*	Hydromorphie*	Profondeur d'apparition du substrat*	Aptitude à l'épandage (ha)			Raison d'exclusion	Surface épandable à 50 m des tiers - *digestat solide et liquide épandu avec pendillards*	
										Classe 0	*Classe 1*	*Classe 2*		interdite	restante
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	3	3,1	7,93	Mais fourrage	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	7,93	0,00		0,00	7,93
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	3	3,2	2,36	Jachère	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	2,36	0,00	Cours d'eau	1,18	1,18
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAVEIGNES	4	4,1	2,11	Mais fourrage	Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	2,11	0,00	0,00	Cours d'eau - sol à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAVEIGNES	4	4,2	0,03	Jachère	Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Autre	Substrat entre 80 et 120 cm	0,03	0,00	0,00	Cours d'eau - sol à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAVEIGNES	5	5,1	10,00	Mais fourrage	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	10,00	0,00		0,00	10,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAVEIGNES	5	5,2	13,03	Mais fourrage	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Autre	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	13,03	0,00	Tiers	0,20	12,83
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAVEIGNES	6	6,1	3,50	Blé tendre	Rendzines claires fortement effervescentes	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	3,50	0,00		0,00	3,50
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	6	6,2	3,81	Blé tendre	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	3,81	0,00		0,00	3,81
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	7	7	3,03	Prairie temporaire	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	3,03	0,00	Tiers	0,48	2,55
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	8	8	2,57	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,57	0,00		0,00	2,57
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	9	9,1	23,29	Mais fourrage	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	23,29	0,00	Tiers	1,10	22,19
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	9	9,2	0,83	Jachère	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,83	0,00	Tiers	0,83	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	10	10	2,49	Mais fourrage	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,49	0,00	Tiers	0,46	2,03
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	11	11,1	0,34	Prairie temporaire	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,34	0,00		0,00	0,34
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	11	11,2	1,19	Mais fourrage	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,19	0,00		0,00	1,19
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	12	12	7,03	Mais fourrage	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	7,03	0,00		0,00	7,03
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	13	13	11,81	Prairie temporaire	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	11,81	0,00	Tiers	0,00	11,81
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	14	14	1,43	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,43	0,00		0,00	1,43
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAMPIGNY SUR VEUDE	15	15	8,04	Prairie temporaire	Sols bruns modaux, mésotrophes	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	8,04	0,00	Tiers	0,48	7,56
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAMPIGNY SUR VEUDE	16	16	20,02	Prairie temporaire	Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Autre	Substrat entre 40 et 80 cm	20,02	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sol à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAMPIGNY SUR VEUDE	17	17	2,40	Prairie temporaire	Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Autre	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	2,40	0,00	0,00	Sols à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAVEIGNES	18	18	2,34	Triticale	Rendzines brunes moyennement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,34	0,00	Tiers	0,08	2,26
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	21	21	11,48	Mais fourrage	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	11,48	0,00	Privilégier le digestat solide	0,00	11,48
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	22	22,1	3,74	Blé tendre	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	3,74	0,00	Privilégier le digestat solide	0,00	3,74
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	22	22,2	2,09	Jachère	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	2,09	0,00	Tiers, cours d'eau, privilégier le digestat solide	1,92	0,17
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	23	23,1	10,38	Mais fourrage	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	10,38	0,00		0,00	10,38
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	23	23,2	1,39	Jachère	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,39	0,00	Cours d'eau	1,24	0,15
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	24	24,1	1,40	Mais fourrage	Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	1,40	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sol à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	24	24,2	1,41	Mais fourrage	Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Autre	Substrat entre 80 et 120 cm	1,41	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sol à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	24	24,3	0,62	Jachère	Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,62	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sols à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	25	25	12,62	Mais fourrage	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	12,62	0,00	Tiers	0,45	12,17
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	26	26,1	18,40	Luzerne	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	18,40	0,00	Privilégier le digestat solide	0,00	18,40
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	26	26,2	15,04	Mais fourrage	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	15,04	0,00	Tiers, privilégier le digestat solide	0,06	14,98
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	27	27,1	5,25	Mais fourrage	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	5,25	0,00	Tiers	0,26	4,99
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	27	27,2	0,32	Jachère	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	0,32	0,00	Tiers	0,32	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	28	28,1	3,40	Mais fourrage	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	3,40	0,00	Cours d'eau	0,32	3,08
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	28	28,2	0,06	Jachère	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,06	0,00	Cours d'eau	0,06	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	VERNEUIL LE CHÂTEAU	29	29	2,30	Luzerne	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	2,30	0,00	Tiers	0,00	2,30
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	VERNEUIL LE CHÂTEAU	30	30,1	1,14	Jachère	Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Autre	Substrat au-delà de 1,20m	1,14	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sols à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	VERNEUIL LE CHÂTEAU	30	30,2	1,78	Luzerne	Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Autre	Substrat au-delà de 1,20m	1,78	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sols à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAMPIGNY SUR VEUDE	31	31	2,19	Prairie temporaire	Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Autre	Substrat entre 40 et 80 cm	2,19	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sols à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAMPIGNY SUR VEUDE	32	32	3,49	Prairie temporaire	Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Autre	Substrat entre 40 et 80 cm	3,49	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sols à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAMPIGNY SUR VEUDE	33	33	3,76	Prairie temporaire	Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Autre	Substrat entre 40 et 80 cm	3,76	0,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sols à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHEZELLES	34	34	16,12	Jachère	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	16,12	0,00	Cours d'eau, tiers	1,18	14,94
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	VERNEUIL LE CHÂTEAU	98	98	0,93	Mais fourrage	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,93	0,00		0,00	0,93
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	VERNEUIL LE CHÂTEAU	99	99	6,31	Mais fourrage	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	6,31	0,00	Tiers	0,21	6,10
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	100	100	2,03	Triticale	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	2,03	0,00		0,00	2,03
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	COURCOUE	101	101	0,48	Triticale	Sols bruns calciques ou eutrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,48	0,00		0,00	0,48
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	CHAVEIGNES	102	102	0,78	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,78	0,00		0,00	0,78
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	LA TOUR SAINT GELIN	103	103	0,60	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,60	0,00	Tiers	0,00	0,60
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	LA TOUR SAINT GELIN	104	104	0,49	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,49	0,00		0,00	0,49
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	LA TOUR SAINT GELIN	105	105	1,79	Luzerne	Sols bruns calciques ou eutrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	1,79	0,00		0,00	1,79
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	LA TOUR SAINT GELIN	106	106	1,30	Blé tendre	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,30	0,00		0,00	1,30
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	Indre-et-Loire	LA TOUR SAINT GELIN	107	107	1,32	Triticale	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	1,32	0,00	Tiers	0,00	1,32

SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	**Indre-et-Loire**	**LA TOUR SAINT GELIN**	**108**	108	0,28	Triticale	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	0,28	0,00	Tiers	0,00	0,28
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	**Indre-et-Loire**	**LA TOUR SAINT GELIN**	**109**	109	0,94	Triticale	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,94	0,00		0,00	0,94
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	**Indre-et-Loire**	**LA TOUR SAINT GELIN**	**110**	110	1,17	Triticale	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	1,17	0,00		0,00	1,17
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	**Indre-et-Loire**	**LA TOUR SAINT GELIN**	**111**	111	0,29	Triticale	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,29	0,00	Privilégier le digestat solide pour hydromorphie temporaire	0,00	0,29
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**112**	112	1,09	Triticale	Sols bruns calciques ou eutrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	1,09	0,00		0,00	1,09
SCEA DOMAINE DE LA CROIX MORIN	**Indre-et-Loire**	**LA TOUR SAINT GELIN**	**113**	113	0,63	Luzerne	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,63	0		0,00	0,63
				SOUS-TOTAL	**268,39**					**40,35**	**228,04**	**0,00**	**0,00**	**10,83**	**217,21**
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**1**	1	16,14	Tournesol	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	16,14	0,00	Tiers, privilégier le digestat solide	0,57	15,57
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**2**	2	2,52	Luzerne	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,52	0,00		0,00	2,52
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**3**	3	2,86	Blé tendre	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,86	0,00	Tiers	0,00	2,86
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**4**	4	5,91	Blé tendre	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	5,91	0,00	Tiers	0,48	5,43
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**5**	5,1	17,97	Colza hiver	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	17,97	0,00	Tiers	1,22	16,75
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**5**	5,2	0,02	Autres utilisations	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,02	0,00	Tiers	0,02	0,00
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**6**	6	3,98	Luzerne	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	3,98	0,00	Tiers	0,45	3,53
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**7**	7,1	11,14	Blé tendre	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	11,14	0,00	Cours d'eau, tiers, privilégier le digestat solide	0,31	10,83
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**7**	7,2	0,06	Bande tampon	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	0,06	0,00	Cours d'eau, tiers, privilégier le digestat solide	0,06	0,00
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**8**	8	2,24	Blé dur	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,24	0,00		0,00	2,24
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**9**	9	0,98	Blé dur	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,98	0,00		0,00	0,98
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**10**	10,1	1,10	Blé tendre	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,10	0,00		0,00	1,10
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**10**	10,2	0,11	Autres utilisations	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,11	0,00	Autres utilisations	0,11	0,00
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**11**	11,1	4,60	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	4,60	0,00	Tiers	0,26	4,34
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**11**	11,2	1,09	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	1,09	0,00		0,00	1,09
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**12**	12,1	0,10	Autres utilisations	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,10	0,00	Tiers	0,10	0,00
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**12**	12,2	0,31	Blé tendre	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,31	0,00	Tiers	0,13	0,18
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**13**	13,1	0,33	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,33	0,00		0,00	0,33
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**13**	13,2	0,59	Luzerne	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,59	0,00		0,00	0,59
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**14**	14	1,05	Prairie temporaire	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,05	0,00	Tiers	0,57	0,48
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**15**	15,1	0,08	Bande tampon	Sols à caractères vertiques marqués	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	0,08	0,00	Tiers, cours d'eau, privilégier le digestat solide	0,08	0,00
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**15**	15,2	7,51	Blé tendre	Sols à caractères vertiques marqués	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	7,51	0,00	Cours d'eau, privilégier le digestat solide	0,45	7,06
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**15**	15,3	0,01	Autres utilisations	Sols à caractères vertiques marqués	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	0,01	0,00	Cours d'eau, privilégier le digestat solide	0,01	0,00
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**16**	16	4,50	Blé dur	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	4,50	0,00	Tiers	0,82	3,68
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**17**	17	1,43	Luzerne	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	1,43	0,00		0,00	1,43
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**18**	18	0,21	Luzerne	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,21	0,00		0,00	0,21
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**19**	19	1,14	Blé tendre	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	1,14	0,00	Captage périmètre de protection rapproché, épandage de digestat solide	0,00	1,14
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**20**	20	7,37	Maïs fourrage	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	7,37	0,00		0,00	7,37
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**21**	21	1,79	Luzerne	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	1,79	0,00		0,00	1,79
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**22**	22	3,00	Blé dur	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	3,00	0,00	Tiers	0,62	2,38
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**23**	23	5,00	Luzerne	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	5,00	0,00	Tiers	0,14	4,86
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**24**	24	0,20	Maïs fourrage	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,20	0,00		0,00	0,20
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**25**	25	0,52	Luzerne	Sols bruns modaux, mésotrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,52	0,00	Tiers	0,31	0,21
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**26**	26,1	2,56	Luzerne	Sols bruns modaux, mésotrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,56	0,00	Tiers	0,46	2,10
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**26**	26,2	0,92	Orge de printemps	Sols bruns modaux, mésotrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,92	0,00		0,00	0,92
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**28**	28	0,61	Blé dur	Sols bruns modaux, mésotrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,61	0,00	Tiers	0,16	0,45
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**29**	29	1,22	Orge de printemps	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,22	0,00		0,00	1,22
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**30**	30	0,54	Orge de printemps	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,54	0,00		0,00	0,54
RICHARD Richard	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**31**	31	1,37	Prairie temporaire	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	1,37	0,00	Tiers	0,23	1,14
				SOUS-TOTAL	**113,08**					**0,00**	**113,08**	**0,00**		**7,56**	**105,52**
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**1**	1,1	0,65	Asperges	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,65	0,00	0,00	Tiers, hydromorphie temporaire, drainage faible à très faible.	0,65	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**1**	1,2	0,06	Jachère	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,06	0,00	0,00	Tiers, hydromorphie temporaire, drainage faible à très faible.	0,06	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**1**	1,3	0,65	Asperges	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,65	0,00	0,00	Hydromorphie temporaire, drainage faible à très faible.	0,65	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**CHAVEIGNES**	**2**	2	2,76	Féverolles	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	2,76	0,00		0,00	2,76
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**CHAVEIGNES**	**3**	3	1,82	Féverolles	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,82	0,00	Tiers	0,03	1,79
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**4**	4	4,27	Tournesol	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	4,27	0,00	Tiers	0,00	4,27
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**6**	6	3,70	Tournesol	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	3,70	0,00	Tiers	0,48	3,22
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**7**	7,1	0,52	Jachère	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,52	0,00	Tiers, périmètre de captage épandage de digestat solide ou fumier uniquement	0,52	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**7**	7,2	0,50	Asperges	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,50	0,00	Tiers, périmètre de captage épandage de digestat solide ou fumier uniquement	0,41	0,09
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**8**	8,1	0,07	Jachère	Sols à pseudogley (hydromorphie temporaire)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,07	0,00	0,00	Tiers, cours d'eau, périmètre de captage épandage de digestat solide ou fumier uniquement sols à	0,00	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**8**	8,2	0,17	Jachère	Sols à pseudogley (hydromorphie temporaire)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,17	0,00	0,00	Tiers, cours d'eau, périmètre de captage épandage de digestat solide ou fumier uniquement, sols à	0,00	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**8**	8,3	0,40	Asperges	Sols à pseudogley (hydromorphie temporaire)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,40	0,00	0,00	Tiers, cours d'eau, périmètre de captage épandage de digestat solide ou fumier uniquement, sols à	0,00	0,00

POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**8**	8,4	2,04	Blé tendre	Sols à pseudogley (hydromorphie temporaire)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	2,04	0,00	0,00	Tiers, cours d'eau, périmètre de captage épandage de digestat solide ou fumier uniquement. sols à	0,00	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**9**	9,1	1,39	Blé tendre	Sols bruns modaux, mésotrophes	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	1,39	0,00	0,00	Cours d'eau, périmètre de captage épandage de digestat solide ou fumier uniquement	1,39	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**9**	9,2	0,11	Jachère	Sols bruns modaux, mésotrophes	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,11	0,00	0,00	Cours d'eau, périmètre de captage épandage de digestat solide ou fumier uniquement	0,11	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**10**	10,1	2,85	Blé tendre	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,85	0,00	Cours d'eau, périmètre de captage épandage de	2,85	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**10**	10,2	0,09	Jachère	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,09	0,00	Cours d'eau, périmètre de captage épandage de	0,02	0,07
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**11**	11,1	2,41	Blé tendre	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,41	0,00	Cours d'eau	0,22	2,19
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**11**	11,2	0,05	Jachère	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,05	0,00	Cours d'eau	0,05	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**12**	12	6,74	Colza hiver	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	6,74	0,00	Tiers, privilégier le digestat solide	1,14	5,60
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**13**	13	8,96	Blé tendre	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	8,96	0,00	Tiers, privilégier le digestat solide (faible pente)	0,33	8,63
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**14**	14	1,79	Blé dur	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	1,79	0,00	Cours d'eau	0,20	1,59
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**15**	15	0,51	Jachère	Sols bruns modaux, mésotrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,51	0,00	Périmètre de captage épandage de digestat solide	0,51	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**16**	16,1	1,10	Jachère	Sols bruns modaux, mésotrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,10	0,00	Cours d'eau, périmètre de captage épandage de	1,10	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**16**	16,2	0,55	Blé tendre	Sols bruns modaux, mésotrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,55	0,00	Cours d'eau, périmètre de captage épandage de	0,55	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**17**	17	1,24	Tournesol	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,24	0,00		0,00	1,24
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**18**	18	0,98	Féverolles	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,98	0,00		0,00	0,98
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**19**	19	1,02	Tournesol	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,02	0,00		0,00	1,02
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**20**	20,1	0,76	Prairie temporaire	Sols bruns calciques ou eutrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,76	0,00	Cours d'eau	0,76	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**20**	20,2	11,35	Blé tendre	Sols bruns calciques ou eutrophes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	11,35	0,00	Tiers, cours d'eau	0,11	11,24
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**21**	21	1,28	Féverolles	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	1,28	0,00	Tiers	0,00	1,28
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**22**	22	1,55	Colza hiver	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,55	0,00	Tiers	0,16	1,39
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**23**	23	4,33	Colza hiver	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	4,33	0,00	Cours d'eau, tiers, privilégier le digestat solide (faible pente)	0,77	3,56
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**24**	24	1,90	Asperges	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,90	0,00	Tiers	0,47	1,43
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**25**	25	5,23	Colza hiver	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	5,23	0,00	Tiers	1,03	4,20
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**26**	26	1,75	Maïs grain	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,75	0,00		0,00	1,75
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**27**	27	0,39	Jachère	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,39	0,00	Tiers	0,17	0,22
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**28**	28,1	6,75	Tournesol	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	6,75	0,00	Cours d'eau, attendre ressuyage complet	1,91	4,84
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**28**	28,2	0,77	Jachère	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,77	0,00		0,00	0,77
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**29**	29	0,63	Tournesol	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,63	0,00		0,00	0,63
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**30**	30,1	5,15	Blé tendre	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	5,15	0,00	Cours d'eau	1,46	3,69
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**30**	30,2	0,16	Jachère	Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,16	0,00	0,00	Sols à nappe permanente	0,00	0,00
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**31**	31	1,64	Blé tendre	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	1,64	0,00	Tiers	0,03	1,61
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**32**	32	4,49	Blé tendre	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	4,49	0,00	Tiers	0,67	3,82
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**33**	33	2,63	Blé tendre	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,63	0,00		0,00	2,63
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**34**	34	4,83	Blé dur	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	4,83	0,00		0,00	4,83
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**35**	35	1,14	Blé dur	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,14	0,00		0,00	1,14
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**CHAVEIGNES**	**36**	36	0,66	Tournesol	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,66	0,00		0,00	0,66
POISSON Florent	**Indre-et-Loire**	**COURCOUE**	**37**	37	0,80	Tournesol	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	0,80	0,00		0,00	0,80
				SOUS-TOTAL	**105,59**					**5,70**	**99,89**	**0,00**		**18,81**	**83,94**
CHEVRIEUX Caroline	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**1**	1	14,82	Maïs fourrage	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	14,82	0,00	Tiers	0,08	14,74
CHEVRIEUX Caroline	**Indre-et-Loire**	**BRASLOU**	**3**	3	5,87	Maïs fourrage	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	5,87	0,00	Tiers	1,23	4,64
				SOUS-TOTAL	**20,69**					**0,00**	**20,69**	**0,00**	**0,00**	**1,31**	**19,38**
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**CHEZELLES**	**1**	1	8,52	Tournesol	Sols bruns calcaires Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat de moins de 40 à 80 cm	0,00	8,52	0,00	Cours d'eau	0,24	8,28
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**2**	2	13,04	Blé tendre	Sols bruns calcaires Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat de moins de 40 à 80 cm	0,00	13,04	0,00	Tiers	0,27	12,77
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**3**	3	12,32	Tournesol	Sols à caractères vertiques marqués Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	3,20	9,12	0,00	Cours d'eau, tiers, sol à nappe permanente	2,46	6,66
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**4**	4	10,19	Maïs grain	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	10,19	0,00	Tiers	0,31	9,88
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**5**	5	2,73	Tournesol	Sols à caractères vertiques marqués Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	1,30	1,43	0,00	Cours d'eau, sol à nappe permanente, hydromorphie temporaire, drainage faible à très faible.	1,30	0,13
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**7**	7	8,18	Blé tendre	Sols bruns calcaires Sols à caractères vertiques marqués Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,34	7,84	0,00	Cours d'eau, (inclus dans aptitude o) sol à nappe permanente, hydromorphie temporaire, drainage faible à très faible.	0,00	7,84
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**8**	8,1	5,42	Autre surface	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	1,10	4,32	0,00	Cours d'eau (inclus dans aptitude o), taillis, sol à nappe permanente	5,42	0,00
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**8**	8,2	8,70	Blé tendre	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	8,70	0,00	Cours d'eau	0,00	8,70
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**9**	9	12,32	Blé tendre	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	12,32	0,00	Privilégier le digestat solide (hydromorphie temporaire), drainage faible à très faible.	0,49	11,83
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**CHEZELLES**	**14**	14	9,69	Maïs grain	Sols à caractères vertiques marqués Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,10	9,59	0,00	Cours d'eau, privilégier le digestat solide (hydromorphie temporaire)	0,96	8,63
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**15**	15	9,96	Féverolles	Sols bruns calcaires Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat de moins de 40 à 80 cm	0,00	9,96	0,00	Tiers	1,97	7,99
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**16**	16	9,88	Luzerne	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	9,88	0,00		0,00	9,88
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**17**	17	8,96	Blé tendre	Sols bruns calcaires Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat de moins de 40 à 80 cm	0,00	8,96	0,00	Tiers	0,13	8,83

SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**20**	20	7,42	Blé tendre	Sols à caractères vertiques marqués	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	7,42	0,00	0,00	Hydromorphie temporaire, drainage faible à très faible.	0,00	0,00
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**23**	23	5,49	Blé tendre	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	5,49	0,00	Cours d'eau	0,27	5,22
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**24**	24	2,15	Blé tendre	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,15	0,00	Cours d'eau	0,01	2,14
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**25**	25	2,85	Blé tendre	Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Autre	Substrat au-delà de 1,20m	2,85	0,00	0,00	Cours d'eau, sol à nappe permanente	0,00	0,00
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**26**	26	1,09	Pois	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,09	0,00	Tiers	0,18	0,91
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**65**	65	0,69	Jachère	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,69	0,00	Cours d'eau	0,50	0,19
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**66**	66	14,03	Féverolles	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	1,89	12,14	0,00	Tiers, Cours d'eau (inclus dans aptitude o), sol à nappe permanente	0,00	12,14
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**67**	67	2,86	Blé tendre	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,86	2,00	0,00	Cours d'eau, tiers, sol à nappe permanente	1,72	0,28
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**70**	70	3,69	Millet	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	3,69	0,00		0,00	3,69
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**71**	71	7,09	Maïs grain	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	7,09	0,00	Privilégier le digestat solide (hydromorphie temporaire)	0,00	7,09
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**72**	72,1	0,90	Autre culture	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,90	0,00	Autre culture	0,90	0,00
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**72**	72,2	1,67	Autre culture	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,67	0,00	Autre culture	1,67	0,00
SCEA DE LOUZILLERE	**Indre-et-Loire**	**VERNEUIL LE CHÂTEAU**	**72**	72,3	0,65	Autre culture	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,65	0,00	Autre culture	0,65	0,00
			SOUS-TOTAL		**170,49**					**19,06**	**151,43**	**0,00**	**0,00**	**19,45**	**133,08**
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**2**	2	17,41	Colza hiver	Sols alluviaux non calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	17,41	0,00		0,00	17,41
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**3**	3,1	8,86	Maïs grain	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	8,86	0,00		0,00	8,86
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**3**	3,2	0,21	Autres utilisations	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,21	0,00	Autres utilisations	0,21	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**5**	5	1,86	Colza hiver	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,86	0,00	cours d'eau	0,11	1,75
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**6**	6	2,95	Blé tendre	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 80 et 120 cm	1,27	1,68	0,00		0,00	1,68
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**7**	7	3,58	Jachère	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	3,58	0,00		0,00	3,58
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**8**	8,1	0,06	Bande tampon	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,06	0,00		0,06	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**8**	8,2	1,41	Maïs grain	Sols colluviaux saturés ou calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,41	0,00		0,00	1,41
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**9**	9	2,82	Orge d'hiver	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,82	0,00	Tiers	0,00	2,82
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**11**	11	0,93	Jachère	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,37	0,56	0,00	cours d'eau	0,30	0,26
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**13**	13	5,11	Orge d'hiver	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	5,11	0,00	cours d'eau	0,00	5,11
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**16**	16,1	0,32	Bande tampon	Sols bruns calciques ou eutrophes Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,16	0,16	0,00	cours d'eau	0,16	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**16**	16,2	6,74	Blé dur	Sols bruns calciques ou eutrophes Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	6,74	0,00	cours d'eau	1,58	5,16
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**17**	17	5,11	Colza hiver	Sols bruns calcaires	#N/A	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	5,11	0,00		0,00	5,11
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**18**	18	3,29	Blé dur	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,31	2,98	0,00	cours d'eau	0,19	2,79
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**24**	24,1	1,11	Colza hiver	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	1,11	0,00	Tiers	0,00	1,11
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**24**	24,2	0,23	Jachère	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat au-delà de 1,20m	0,00	0,23	0,00	Tiers	0,00	0,23
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**LIGRE**	**32**	32	17,02	Blé dur	Rendzines claires fortement effervescentes	Ressuyage correct à favorable	Substrat à moins de 40 cm de profondeur	0,00	17,02	0,00	Tiers	0,43	16,59
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**36**	36	5,82	Orge d'hiver	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	5,82	0,00	Tiers	0,02	5,80
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**39**	39	2,84	Orge d'hiver	Sols bruns calciques ou eutrophes	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	2,84	0,00		0,00	2,84
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**40**	40,1	0,23	Bande tampon	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,23	0,00	0,00	tiers, cours d'eau (inclus dans aptitude o)	0,00	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**40**	40,2	1,79	Maïs grain	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,39	1,40	0,00	tiers, cours d'eau	0,28	1,12
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**44**	44,1	10,59	Blé tendre	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	10,59	0,00		0,00	10,59
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**44**	44,2	0,25	Jachère	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,25	0,00		0,00	0,25
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**101**	101	1,05	Maïs grain	Sols bruns calcaires	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,05	0,00	tiers	0,00	1,05
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**102**	102,1	0,32	Bande tampon	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,32	0,00		0,32	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**102**	102,2	2,60	Jachère	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	2,60	0,00		0,00	2,60
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**103**	103,1	0,18	Bande tampon	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,18	0,00		0,18	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**103**	103,2	0,35	Autres utilisations	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,35	0,00	Autres utilisations	0,35	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**103**	103,3	1,68	Maïs grain	Sols bruns calcaires	Drainage imparfait. Hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm.	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,68	0,00		0,00	1,68
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**104**	104,1	3,58	Blé dur	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	#N/A	0,00	3,58	0,00	cours d'eau	1,01	2,57

BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**104**	104,2	0,18	Bande tampon	Sols bruns calcaires	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	#N/A	0,00	0,18	0,00	cours d'eau	0,18	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**105**	105,1	6,20	Maïs grain	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	6,20	0,00		0,00	6,20
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**ASSAY**	**105**	105,2	0,12	Bande tampon	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,12	0,00		0,12	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**CHAMPIGNY SUR VEUDE**	**117**	117	1,07	Jachère	Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés	Ressuyage correct à favorable	Substrat entre 80 et 120 cm	0,00	1,07	0,00		0,00	1,07
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**LIGRE**	**132**	132,1	0,20	Bande tampon	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,20	0,00	0,00	cours d'eau (inclus dans aptitude 0) tiers	0,00	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**LIGRE**	**132**	132,2	18,59	Blé tendre	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	3,98	14,61	0,00	cours d'eau (inclus dans aptitude 0) tiers	0,00	14,61
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**LIGRE**	**132**	132,3	0,36	Bande tampon	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	0,36	0,00	cours d'eau (inclus dans aptitude 0) tiers	0,36	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**LIGRE**	**132**	132,4	1,97	Autres utilisations	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde (gley à plus de 80cm de profondeur)	Drainage faible à très faible. Hydromorphie temporaire à moins de 40 cm	Substrat entre 40 et 80 cm	0,00	1,97	0,00	Autres utilisations	1,97	0,00
BRISSEAU Guy	**Indre-et-Loire**	**LIGRE**	**132**	132,5	14,60	Maïs grain	Sols bruns calcaires Sols à nappe permanente profonde	Drainage faible à très faible. Hydromorphie	Substrat entre 40 et 80 cm	3,99	10,61	0,00		0,00	10,61
				SOUS-TOTAL	153,59					10,90	142,69	0,00		7,83	134,86
		TOTAL			**831,83**					**76,01**	**755,82**	**0,00**		**65,79**	**693,99**